

Prospect: Informații pentru utilizator**Bronchostop Duo gumă orală**

extract uscat din frunză de cimbru, extract uscat din rădăcină de nalbă mare

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Dacă simptomele persistă în timpul utilizării medicamentului sau dacă apar reacții adverse care nu sunt menționate în prospect, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Bronchostop Duo gumă orală și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Bronchostop Duo gumă orală
3. Cum să luați Bronchostop Duo gumă orală
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Bronchostop Duo gumă orală
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Bronchostop Duo gumă orală și pentru ce se utilizează

Bronchostop Duo este un medicament din plante medicinale cu utilizare tradițională utilizat pentru a ameliora iritația faringiană și tusea seacă asociată și pentru a favoriza expectorația mucusului vâscos în caz de tuse asociată cu răceala.

Acest medicament din plante medicinale cu utilizare tradițională se administrează pentru indicația specificată exclusiv pe baza utilizării îndelungate.

Bronchostop Duo este indicat pentru utilizare la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Bronchostop Duo gumă orală**Nu luați Bronchostop Duo gumă orală:**

- dacă sunteți alergic la frunza de cimbru, la rădăcina de nalbă mare sau la alte plante din familia

Lamiaceae sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să luați Bronchostop Duo gumă orală, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Dacă apar febră, dificultăți la respirație sau expectorație cu puroi trebuie să vă adresați fără întârziere unui medic.

Copii

Nu este recomandată utilizarea la copii cu vârsta sub 6 ani, din cauza riscului de înghițire neintenționată a gumei orale întregi.

Bronchostop Duo gumă orală împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați/utilizați, ați luat/utilizat recent sau s-ar putea să luați/utilizați orice alte medicamente.

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece nu sunt suficiente date disponibile, nu se recomandă utilizarea în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Bronchostop Duo gumă orală conține maltitol și sorbitol

Bronchostop Duo gumă orală conține maltitol 615 mg și sorbitol 210 mg în fiecare gumă orală. Sorbitolul este o sursă de fructoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că dumneavoastră (sau copilul dumneavoastră) aveți intoleranță la unele categorii de glucide, sau dacă ați fost diagnosticat cu intoleranță ereditară la fructoză, o afecțiune genetică rară ce afectează metabolizarea fructozei, vă rugăm să vă adresați medicului înainte de a lua sau utiliza acest medicament.

Bronchostop Duo gumă orală conține propilenglicol

Acest medicament conține propilenglicol 6,42 mg în fiecare gumă orală.

Bronchostop Duo gumă orală conține alcool benzilic

Acest medicament conține alcool benzilic 0,01mg în fiecare gumă orală. Alcoolul benzilic poate provoca reacții alergice.

Bronchostop Duo gumă orală conține sodiu

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) în fiecare gumă orală, adică practic „nu conține sodiu”.

3. Cum să luați Bronchostop Duo gumă orală

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani:

2 gume orale la interval de 3 până la 4 ore (de 4 până la 6 ori pe zi; doza zilnică maximă este de 12 gume orale).

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani:

1 gumă orală la interval de 3 până la 4 ore (de 4 până la 6 ori pe zi; doza zilnică maximă este de 6 gume orale).

Utilizarea la copii

Nu este indicată utilizarea la copii cu vârsta sub 6 ani.

Mod de administrare:

Pentru administrare orală.

Lăsați să se dizolve în gură prin supt.

Durata de utilizare:

Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele persistă sau nu se ameliorează semnificativ după 5 zile de utilizare a medicamentului.

Dacă luați mai mult Bronchostop Duo gumă orală decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să luați Bronchostop Duo gumă orală

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Au fost observate reacții de hipersensibilitate, precum și tulburări gastro-intestinale în cazul medicamentelor care conțin cimbru. Frecvența de apariție nu este cunoscută.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Bronchostop Duo gumă orală

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister și cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Bronchostop Duo gumă orală

- **Substanțele active sunt:**

O gumă orală conține:

Extract (sub formă de extract uscat) din frunză de *Thymus vulgaris* L. și *Thymus zygis* L. (frunză de cimbru) (7-13:1) 51,1 mg. Solvent de extracție: apă.

Extract (sub formă de extract uscat) din *Althaea officinalis* L. (rădăcină de nalbă mare) (7-9:1) 4,5 mg. Solvent de extracție: apă.

- **Celelalte componente sunt:**

Acacia (gumă arabică) (E414)

Sorbitol lichid (necristalizabil) (E420)

Maltitol lichid (E965)

Maltodextrină

Acid citric

Zaharină sodică

Aromă de aronia (scoruș negru) (conținând propilenglicol (E1520))

Aromă de fructe de pădure (conținând propilenglicol (E1520) și alcool benzilic (E1519))

Parafină lichidă

Apă purificată

Cum arată Bronchostop Duo gumă orală și conținutul ambalajului

Bronchostop Duo gumă orală se prezintă sub formă de gume orale rotunde (cu diametrul de 19 mm și înălțime 6,5 mm), de culoare brună, cu gust de fructe. Bronchostop Duo gumă orală este ambalat în cutii cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al și sunt disponibile ambalaje care conțin 10, 20, 30 sau 40 gume orale.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21

1160 Viena

Austria

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Austria BRONCHOSTOP Thymian Eibisch Hustenpastillen

Bulgaria Bronchostop Duo 51,1 mg/4,5 mg pastilles

Croația Bronchostop Duo orale gumaste pastile

Republica Cehă Bronchostop perorální měkké pastilky

Estonia	Broncophen Duo, pastillid
Grecia	Bronchoduo κόμμεα από του στόματος
Ungaria	Bronchostop Duo köhögés elleni belsőleges gumipasztila
România	Bronchostop Duo gumă orală
Slovacia	Bronchostop pastilky na cmúľanie
Slovenia	Timijan in slez Bronchostop peroralni gumiji

Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2022.